



發熱處理流程圖



處理呼吸道感染爆發流程圖



發熱護理措施

- 定時評估院友體溫、血含氧量及呼吸率。需要時要立刻報告及記錄，並通知上級或醫生
- 安排院友留在觀察房休息，而其他同房院友則在原房觀察三天
- 保持空氣流通，維持室溫於22-25度，加強房間清潔消毒
- 保持床單、被舖及衣服清潔乾爽
- 鼓勵或協助院友多進水份, 進食易消化及水份高的食物
- 給予冰袋冷敷額部或頸部
- 按醫囑給予適當的藥物治療
- 採取適當的保護裝備
- 雙手應保持清潔，凡接觸院友及處理呼吸系統分泌物後，應立即以正確方法洗手
- 通知家人有關探訪時應遵守的預防措施

應用於安老院舍執行上的實際困難及的意見

- 在測度體溫方面，院舍需安排每日於特定時間進行，雖文獻指出，下午測度體溫較準確，但院舍因考慮到人手問題，在早上進行會較切合實際情況。
- 雖然普遍的長者在嚴重感染時會出現發熱，但部份長者的體溫未必會超出正常的範圍。所以護老者除了觀察及記錄院友體溫變化之外，更應該留意長者身體變化。
- 文獻指出若長者突然出現神志混亂，意識模糊，煩躁不安，亦是常見身體受感染重要表徵之一，所以護老者應多加留意。
- 院友在發燒期間，雖被勸諭逗留在房間，包括用膳及活動，但院友未必願意合作。
- 當院舍向衛生署告發燒個案，院舍會被密切觀察情況，衛生署並會指令院舍停止舉辦大型活動，並於院舍入口處張貼通告告知會訪客。