


「2007年全國藥物濫用防治研討會議」報告

內地戒藥服務的現況

香港社會服務聯會
羅琳

2007年12月11日

內地藥物濫用情況 (1997-2004)



■ 吸毒人數比率
(1/10,000)

內地濫藥趨勢的變化

80年代	90年代	2000年後
鴉片	鴉片	鴉片
安鈉咖	海洛英	海洛英
	度冷丁	度冷丁
	安鈉咖	安鈉咖
	鎮靜催眠藥 (三唑侖)等	鎮靜催眠藥
	二氫埃托啡	冰毒
	曲馬多	“麻谷丸”
	大麻	氯胺酮
		搖頭丸
		曲馬多
		Bup
		大麻



新形勢下的問題與挑戰

鴉片類的戒毒、康復、預防重吸
(舊問題)


派對藥物 (新問題)

“三減” 戰略概念

減少毒品供應 (Supply Reduction)

減少毒品需求 (Demand Reduction)

減少毒品危害 (Harm Reduction)



減少供應

替代種植

提高毒源地區居民生活和經濟水平

發展經濟

立法

執法

減少需求

預防及教育

治療 (脫毒、康復、操守)

- 脫毒：強制戒毒、勞教戒毒、自願戒毒
- 康復：2007年底建成15個戒毒康復所，容納8,600人
- 心理治療
- 恢復社會功能 (技能培訓、就業安置)

科研及調查

美沙銅維持治療 (MMT)


實施三年的初步評估

1. 減少由吸毒引起的犯罪活動
2. 遏制AIDS, 肝炎等傳染病
3. 有助成癮者回歸社會
4. 具經濟效益

2004年3月至2007年6月，全國22個省、區、市
累計服藥者 = 66,619；6月份服藥人數41,878人
全國320個門診點，平均每個門診在治人數128人



內地戒毒服務 (2006年)




過往內地戒毒康復工作的問題

1. 重視脫毒治療，忽略身心康復
2. 重視所內戒毒，忽略社區防治

新方向：建立一個以各級政府為主導，
以社區參與為基礎的防治體系。

社區藥物濫用防治模式



有趣治療法

河豚毒素治療

加味血府逐瘀湯



河豚毒素治療鴉片類藥物依賴

臨床證實河豚毒素 (TTX) 對戒毒有奇效

相當於嗎啡的3200倍，能緩解毒癮

為3000位吸毒者戒毒，有效率達100%。

加味血府逐瘀湯合併美沙酮治療海洛因

減輕撤藥反應 (withdrawal symptom) 和稽延反應 (craving)

中醫學“不通則痛”，肌肉關節疼痛，實為氣血不通所致。

桃仁、紅花、川芎、赤芍、牛膝均有活血化瘀、行氣止痛之功效；附片、乾姜以溫裡祛寒。

藥方：桃仁12g 紅花10g 當歸10g 生地12g 川芎15g 赤芍10g 牛膝10g 元胡15g 附片6g 乾姜6g等

家庭食療法戒毒

愛心飲料

配以西瓜，蜂蜜，綠豆

適用於新舊藥物依賴

脫毒，緩解戒斷症狀

提高免疫功能



謝 謝 !

